

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

គណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

ក្រុមការងារចំពោះកិច្ចគ្រប់គ្រង បែងចែក និងផ្គត់ផ្គង់
ឱសថយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

សេចក្តីជូនដំណឹង
ស្តីពី

ការចែកចាយឱសថម៉ូលណាទ្រីស (ម៉ូលនូពីរ៉ាវ៉ា កាប់ស៊ុល ២០០ មីលីក្រាម)

MOLNATRIS (Molnupiravir Capsules 200mg) តាមសាខាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជានៅតាមខេត្ត

ក្រុមការងារចំពោះកិច្ចគ្រប់គ្រង បែងចែក និងផ្គត់ផ្គង់ឱសថយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា ដើម្បីបន្តចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ បានទាន់ពេលវេលា និងបង្កើតបានភាពសុវត្ថិភាពសហគមន៍រឹងមាំពិតប្រាកដមួយទប់ទល់នឹងជំងឺរាតត្បាតសកលកូវីដ-១៩ ក្រុមការងារបាននិងកំពុងចែកចាយឱសថម៉ូលណាទ្រីស (ម៉ូលនូពីរ៉ាវ៉ា កាប់ស៊ុល ២០០ មីលីក្រាម) MOLNATRIS (Molnupiravir Capsules 200mg) សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ ចាប់ពីកម្រិតស្រាលទៅមធ្យម ចំពោះមនុស្សពេញវ័យ នៅទីស្តីការក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍។ ជាមួយគ្នានេះ ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់សាធារណជនដែលរស់នៅតាមបណ្តាខេត្ត ក្រុមការងារនឹងបន្ថែមការចែកចាយឱសថម៉ូលណាទ្រីស នៅសាខាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជានៅតាមខេត្ត ក្នុងតម្លៃ ៥៥ ដុល្លារអាមេរិក ក្នុង១ដូស (១ដូស ស្មើនឹង ១កំប៉ុង មាន ៤០គ្រាប់) ចាប់ពីថ្ងៃពុធ ទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ នេះតទៅ ជូនមន្ទីរពេទ្យឯកជន គ្លីនិក ឱសថស្ថាន ឱសថស្ថានរង និងសាធារណជន តាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

- បុគ្គលម្នាក់ មានសិទ្ធិបញ្ជាទិញពី៥ ដល់១០ដូស ក្នុង១ដង
- មន្ទីរពេទ្យឯកជន គ្លីនិក ឱសថស្ថាន និងឱសថស្ថានរង មានសិទ្ធិបញ្ជាទិញពី១០ ដល់២០០ដូស (ត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតបើកអាជីវកម្ម) ក្នុង១ដង ហើយអាចលក់បន្តមិនលើសពី ៦៥ ដុល្លារ អាមេរិក ក្នុង១ដូស

ដូចនេះ មន្ទីរពេទ្យឯកជន គ្លីនិក ឱសថស្ថាន ឱសថស្ថានរង និងសាធារណជន អាចបញ្ជាទិញឱសថម៉ូលណាទ្រីស (Molnupiravir Capsules 200mg) ដោយផ្ទាល់នៅទីស្តីការក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ឬសាខាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជានៅតាមខេត្ត (ដូចមានក្នុងតារាងព័ត៌មានលម្អិតជូនភ្ជាប់មកជាមួយ)។ សម្រាប់ការផ្តល់មតិគ្រួសារ អំពីការផ្តល់សេវា ឬព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងទូរសព្ទលេខ ១២៣/ ០៧៧ ៨៦៧ ៩៥៧/០៩៦ ៤៦៦ ៤៦៤៦ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។

សេចក្តីដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមសាធារណជនទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន។ 

ថ្ងៃអង្គារ ១រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានសង្ខេបអំពីឱសថម៉ូលណាទ្រីស

ម៉ូលណូពីរ៉ាវ៉ា កាប់ស៊ុល ២០០ មីលីក្រាម

ក្រុមការងារចំពោះកិច្ចគ្រប់គ្រង បែងចែក និងផ្គត់ផ្គង់ឱសថយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ បាននាំចូលឱសថម៉ូលណាទ្រីស (ម៉ូលណូពីរ៉ាវ៉ា កាប់ស៊ុល ២០០ មីលីក្រាម) សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលមានព័ត៌មានសង្ខេបដូចខាងក្រោម

- + បរិមាណ ១ដួស មាន ៤០គ្រាប់
- + តម្លៃ ៥៥ ដុល្លារ ក្នុង១ដួស
- + ការប្រើប្រាស់
 - សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ ១៩ ចាប់ពីកម្រិតស្រាលទៅមធ្យម ចំពោះមនុស្សពេញវ័យ អាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើង
 - លេបក្រោយទទួលបានអាហាររួច ឬពេលពោះទទេរ និងគួរលេបទាំងមូល ជាមួយទឹកមួយកែវ ដោយមិនត្រូវបើកគ្រាប់ កិនបំបែក ឬទំពារទេ
 - លេបម្តង ៤ គ្រាប់ (ក្នុង ១គ្រាប់មានកម្រិត ២០០ មីលីក្រាម)
 - លេប ១ ថ្ងៃ ២ ដង (រៀងរាល់ ១២ ម៉ោងម្តង សម្រាប់រយៈពេល ៥ ថ្ងៃ)
 - សូមពិភាក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬឱសថការីមុនពេលប្រើឱសថម៉ូលណូពីរ៉ាវ៉ា
- + សូមរក្សាឱសថនេះនៅក្នុងកំប៉ុងដើមបិទជិត នៅទីកន្លែងស្ងួត មានសីតុណ្ហភាពមិនលើស ៣០ អង្សាសេ



សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមអានសេចក្តីណែនាំទូទៅស្តីពីការប្រើប្រាស់ឱសថម៉ូលណាទ្រីស (ម៉ូលណូពីរ៉ាវ៉ា កាប់ស៊ុល ២០០ មីលីក្រាម) តាម QR Code





សេចក្តីណែនាំទូទៅស្តីពី

ការប្រើប្រាស់ឱសថម៉ូលណាទ្រីស (ម៉ូលណូពីរ៉ាវ៉ា កាប់ស៊ុល ២០០ មីលីក្រាម)

MOLNATRIS™ (Molnupiravir Capsules 200mg)

យោងវិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់ក្នុងលក្ខខណ្ឌបន្ទាន់ លេខ៖ ៤៨៨ សខល ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចំពោះឱសថដែលមានចរិតលក្ខណៈដូចខាងក្រោម៖

1. ឈ្មោះផលិតផលឱសថ

- ឈ្មោះឱសថ៖ ម៉ូលណាទ្រីស (ម៉ូលណូពីរ៉ាវ៉ា កាប់ស៊ុល ២០០ មីលីក្រាម)
MOLNATRIS™ (Molnupiravir Capsules 200mg)
- ឱសថនេះគឺជាថ្នាំគ្រាប់ (Capsule) សម្រាប់លេប ដែល ១កំប៉ុង មាន ៤០គ្រាប់

2. រូបមន្តឱសថ

- សារធាតុសកម្ម៖ Molnupiravir 200mg
- សារធាតុរួមផ្សំ៖ Hydroxypropyl Cellulose, Microcrystalline Cellulose, Croscarmellose Sodium, Magnesium Stearate

3. ការប្រើប្រាស់

3.1. ការប្រើប្រាស់ក្នុងការព្យាបាល

Molnupiravir ប្រើសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺឆ្លងបង្កឡើងពីវីរុសកូរូណា ២០១៩ (កូវីដ-១៩) ចាប់ពីកម្រិតស្រាលទៅមធ្យម ចំពោះមនុស្សពេញវ័យ (ចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ ឡើងទៅ) ដែលមានលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានវីរុស SARS-COV-2 និងជាពិសេសគួរប្រើចំពោះបុគ្គលដែលមានហានិភ័យក្នុងការវិវត្តទៅជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ។

3.2. វិធីប្រើ និងកម្រិតប្រើ

- វិធីប្រើ៖ ឱសថ Molnupiravir 200 mg ប្រើដោយលេបតាមមាត់។ គេអាចលេបឱសថនេះ ក្រោយទទួលទានអាហាររួច ឬពេលពោះទទេ និងគួរលេបទាំងមូលជាមួយទឹកមួយកែវ ដោយមិនត្រូវបើកគ្រាប់ កិនបំបែក ឬទំពាទេ។
- កម្រិតប្រើ៖

• មនុស្សពេញវ័យ៖

កម្រិតណែនាំឱ្យប្រើនៃ Molnupiravir គឺលេបម្តង ៨០០មីលីក្រាម (ស្មើនឹងលេប ៤គ្រាប់នៃកម្រិត ២០០មីលីក្រាម) លេបរៀងរាល់ ១២ម៉ោងម្តងសម្រាប់រយៈពេល ៥ថ្ងៃ បន្តបន្ទាប់។ សុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាពរបស់ Molnupiravir នៅពេលប្រើសម្រាប់រយៈពេលយូរជាង ៥ថ្ងៃ មិនទាន់បានសិក្សាបញ្ជាក់នៅឡើយទេ។ គួរប្រើ Molnupiravir ឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន បន្ទាប់ពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរកឃើញជំងឺកូវីដ-១៩ និងអំឡុងពេល ៥ថ្ងៃនៃការលេចចេញរោគសញ្ញា។



ការត្រួតលេបឱសថ៖

ប្រសិនបើអ្នកជំងឺត្រូវលេប Molnupiravir ម្តង ក្នុងអំឡុងរយៈពេល ១០ម៉ោង នោះអ្នកជំងឺត្រូវលេបឱសថនេះឱ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន និងត្រូវបន្តកម្រិតប្រើធម្មតាតាមកាលកំណត់។ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺត្រូវលេបម្តងក្នុងអំឡុងរយៈពេលលើសពី ១០ម៉ោង អ្នកជំងឺមិនគួរលេបកម្រិតប្រើដែលត្រូវលេបនោះទេ ហើយជំនួសមកវិញត្រូវលេបកម្រិតប្រើបន្ទាប់នៅតាមពេលវេលាដែលត្រូវលេបជាធម្មតា។ អ្នកជំងឺមិនត្រូវលេបពីរដងនៃកម្រិតប្រើដើម្បីបំពេញបន្ថែមកម្រិតប្រើដែលបានត្រូវលេបនោះទេ។

• ក្រុមមនុស្សពិសេស៖

មនុស្សចាស់ជរា៖ មិនចាំបាច់មានការកែតម្រូវកម្រិតប្រើ Molnupiravir ដោយផ្អែកលើអាយុទេ ។

អ្នកជំងឺខ្សោយមុខងារតម្រងនោម៖ មិនចាំបាច់មានការកែតម្រូវកម្រិតប្រើសម្រាប់អ្នកជំងឺខ្សោយមុខងារតម្រងនោមទេ ។

អ្នកជំងឺខ្សោយមុខងារថ្លើម៖ មិនចាំបាច់មានការកែតម្រូវកម្រិតប្រើសម្រាប់អ្នកជំងឺខ្សោយមុខងារថ្លើមទេ។

កុមារ៖ សុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាពរបស់ Molnupiravir ចំពោះអ្នកជំងឺអាយុតិចជាង ១៨ឆ្នាំ មិនទាន់បានសិក្សាបញ្ជាក់នៅឡើយទេ។

4. ប្រតិកម្មរំខាន

យោងតាមទិន្នន័យតាមដានសិក្សាបង្ហាញថា ឱសថនេះអាចបណ្តាលឱ្យមានផលរំខានតិចតួច ដូចជា រាតចង្កោរ ក្អក ដឹងធោង ឈឺក្បាល និងអាចមានកន្ទួលលើស្បែក កន្ទួលត្រអាក ។ល។

5. ការប្រើឱសថលើសកម្រិត

មិនទាន់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រើឱសថ Molnupiravir លើសកម្រិត លើមនុស្សនៅឡើយទេ។ ក្នុងករណីប្រើ Molnupiravir លើសកម្រិត គួរតែមានការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកជំងឺ និងអន្តរាគមន៍ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្របន្ទាន់តាមការចាំបាច់។ មធ្យោបាយលាងឈាមមិនត្រូវបានរំពឹងថានឹងមានលទ្ធផលក្នុងការបញ្ចេញចោលឱសថម៉ូលេគុល NHC នេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះទេ។

6. ករណីហាមប្រើ

ហាមប្រើចំពោះអ្នកដែលងាយមានប្រតិកម្មជាមួយសារធាតុសកម្ម ឬសារធាតុរួមផ្សំណាមួយនៃឱសថ។

7. ករណីប្រុងប្រយ័ត្ន

សូមពិភាក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬឱសថការីមុនពេលប្រើឱសថ Molnupiravir ។

8. ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងស្ត្រីបំបៅដោះកូន

- ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ៖

ទោះបីជាមិនមានទិន្នន័យពីការប្រើ Molnupiravir លើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក៏ដោយ ប៉ុន្តែ ការសិក្សាលើសត្វបានបង្ហាញពីការពុលលើភាពបង្កកំណើត។ ដូច្នេះ Molnupiravir មិនត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រើក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះទេ។ ស្ត្រីដែលបម្រុងនឹងមានគភ៌គួរប្រើការពន្យារកំណើតដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់រយៈពេលព្យាបាល និងសម្រាប់រយៈពេល ៤ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រើ Molnupiravir ។



ទីតាំងចែកចាយឱសថម៉ូលណាទ្រីស

មន្ទីរពេទ្យ គ្លីនិក ឱសថស្ថាន ឱសថស្ថានរង និងសាធារណជន អាចបញ្ជាទិញឱសថ
ម៉ូលណាទ្រីស (Molnupiravir Capsules 200mg) គ្រប់រាជធានី- ខេត្តតាមទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

ទីតាំង	អាសយដ្ឋាន	លេខទូរស័ព្ទ
ទីស្តីការក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍	អគារលេខ១៣ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ	123 / 077 867 957
សាខាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ខេត្តកណ្តាល	ផ្លូវលេខ១០៥ កែង២០៦ ភូមិ តាខ្មៅ សង្កាត់តាខ្មៅ ក្រុងតាខ្មៅ	077 929 559 / 015 714 966
សាខាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ខេត្តព្រៃវែង	ភូមិ២ សង្កាត់កំពង់លាវ ក្រុងព្រៃវែង	088 87 11 828 / 096 49 85 277
សាខាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ខេត្តស្វាយរៀង	ភូមិមេត្រីង សង្កាត់ស្វាយរៀង ក្រុងស្វាយរៀង	088 87 11 809 / 081 803 355
សាខាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង	ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិ១ សង្កាត់ខ្សោម ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង	088 87 11 826 / 086 74 86 56
សាខាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ខេត្តពោធិ៍សាត់	ផ្លូវលេខ១(រំបោកស្ទឹង)ភូមិពាលព្រែក២ សង្កាត់ផ្ទះព្រៃ ក្រុងពោធិ៍សាត់	088 87 11 825 / 017 503 375
សាខាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ខេត្តបាត់ដំបង	ផ្លូវលេខ១ ភូមិកម្មករ សង្កាត់ស្វាយរៀង	088 87 11 835 / 077 846 784
សាខាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ	ផ្លូវជាតិលេខ ៥ ភូមិ៣ សង្កាត់ ព្រះពន្លា ក្រុងសិរីសោភ័ណ	012 818 009 / 088 87 11 829
សាខាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ខេត្តឧត្តរមានជ័យ	ភូមិបុរីរដ្ឋបាល សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង	088 240 92 99 / 096 296 53 08
សាខាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ខេត្តសៀមរាប	វិថីពោធិ៍កំបោរ ភូមិមណ្ឌល២ សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប	088 87 11 807 / 017 24 28 47
សាខាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ខេត្តកំពង់ធំ	ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិ៦ សង្កាត់កំពង់ធំ ក្រុងស្ទឹងសែន	088 87 11 805 / 077 27 47 02
សាខាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ខេត្តកំពង់ស្ពឺ	ផ្លូវជាតិលេខ ៤ ភូមិសំណង់ សង្កាត់រកាធំ ក្រុងច្បារមេន	088 87 11 867 / 077 274 718
សាខាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ខេត្តព្រះសីហនុ	វិថីឯករាជ្យ (១០០) ក្រុមទី២៧ ភូមិ៣ សង្កាត់៣ ក្រុងព្រះសីហនុ	088 87 11 848 / 069 910 101
សាខាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ខេត្តកែប	ផ្លូវលេខ៣៣A ភូមិកែប សង្កាត់កែប ក្រុងកែប	088 87 11 847 / 097 933 98 21
សាខាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ខេត្តកំពត	ផ្លូវលេខ៧៣៥ ភូមិ១ឧសភា សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត	088 87 11 846 / 010 591 951
សាខាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា កោះកុង	ភូមិ០១ សង្កាត់ស្នាមមានជ័យ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ	016 454 282 / 096 30 70 626
សាខាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ខេត្តតាកែវ	ផ្លូវលេខ ១៣ ភូមិ២ សង្កាត់ការកុង ក្រុងដូនកែវ	088 87 11 858 / 087 742 068
សាខាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ខេត្តកំពង់ចាម	ផ្លូវខេមរភូមិន្ទ ភូមិ១៤ សង្កាត់កំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ចាម	088 87 11 808 / 092 99 76 56
សាខាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ខេត្តក្រចេះ	ផ្លូវជាតិលេខ ៧ ភូមិស្ទឹងកើត សង្កាត់ស្ទឹង ក្រុងស្ទឹង	088 87 11 411 / 010 628 126
សាខាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ខេត្តប៉ៃលិន	ភូមិ វត្ត សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន	088 87 11 856 / 016 974 919
សាខាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ខេត្តព្រះវិហារ	ផ្លូវលេខ២ ភូមិកណ្តាល សង្កាត់កំពង់ប្រណាក ក្រុងព្រះវិហារ	088 87 11 806
សាខា ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ខេត្តក្រចេះ	ផ្លូវលេខ១២ ភូមិក្រចេះ សង្កាត់ក្រចេះ ក្រុងក្រចេះ	088 87 11 836 / 077 274 712
សាខាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ខេត្តស្ទឹងត្រែង	ផ្លូវ៦៣ ភូមិព្រែក សង្កាត់ស្ទឹងត្រែង ក្រុងស្ទឹងត្រែង	088 87 11 838 / 077 274 753
សាខាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ខេត្តមណ្ឌលគីរី	ភូមិដោះក្រមុំ សង្កាត់សុខដុម ក្រុងសែនមនោរម្យ	088 87 11 865 / 011 624 118
សាខាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ខេត្តរតនគិរី	ផ្លូវជាតិលេខ៧ ៨ ភូមិអភិវឌ្ឍន៍ សង្កាត់ឡាបានសៀក ក្រុងបានលុង	088 87 11 837 / 011 424 408

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងទូរស័ព្ទ: Hotline 123 / 077 867 957 / 096 466 4646

- ស្រ្តីបំបៅដោះកូន៖

គេពុំទាន់បានដឹងនៅឡើយទេថា តើ Molnupiravir ឬសារធាតុផ្សំណាមួយនៃ Molnupiravir មានវត្តមាននៅក្នុងទឹកដោះមនុស្ស ឬប៉ះពាល់ដល់ការផលិតទឹកដោះមនុស្ស ឬមានឥទ្ធិពលដល់ទារកដែលបៅដោះម្តាយនោះទេ។ ការសិក្សាជាមួយនឹង Molnupiravir លើសត្វដែលបៅដោះមិនត្រូវបានធ្វើឡើងទេ។ ដោយផ្អែកលើសក្តានុពលនៃប្រតិកម្មខ្លាំងមកពី Molnupiravir លើកូនក្មេង ការបំបៅដោះកូនមិនត្រូវបានណែនាំទេក្នុងអំឡុងពេលព្យាបាល និងសម្រាប់រយៈពេល ៤ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រើ Molnupiravir ។

ភាពអាចមានកូន៖ មិនមានឥទ្ធិពលលើភាពអាចមានកូនរបស់សត្វញី ឬឈ្មោលក្នុងការសិក្សាលើសត្វកណ្តុរ និងមិនមានការប្រឈមចំពោះមនុស្សនៅកម្រិតដែលបានណែនាំឱ្យប្រើខាងលើ។

9. ប្រតិកម្មជាមួយឱសថដទៃ

មិនមានអន្តរកម្មឱសថត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណឡើយ ដោយផ្អែកលើទិន្នន័យដែលមានតិចតួច។ មិនមានការសិក្សាគ្លីនិកនៃអន្តរកម្មឱសថត្រូវបានធ្វើឡើងជាមួយ Molnupiravir ទេ។

10. ដំបូន្មានក្នុងការប្រើប្រាស់ឱសថ Molnupiravir

សូមអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំទូទៅ ស្តីពីការប្រើប្រាស់ឱសថម៉ូលណាទ្រីស (ម៉ូលនូពីវ៉ាវ៉ា កាប់ស៊ីល 200mg) ឱ្យបានហ្មត់ចត់។ សូមទាក់ទងទៅទូរសព្ទទាន់ហេតុការណ៍ ១២៣ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីចំណុចដែលនៅមានចម្ងល់ ឬរាយការណ៍ពីប្រតិកម្មខ្លាំងនានា។

11. ការរក្សាទុក

សូមរក្សាឱសថនេះនៅក្នុងកំប៉ុងដើមបិទជិត ទុកនៅសីតុណ្ហភាពទាបជាង ឬស្មើនឹង ៣០°C។

12. អាយុកាលប្រើប្រាស់

ឱសថនេះមានអាយុកាលប្រើប្រាស់ ២៤ខែ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទផលិត។ សូមពិនិត្យមើលថ្ងៃខែឆ្នាំផលិត និងផុតកំណត់ ឱ្យបានច្បាស់មុនពេលប្រើប្រាស់។

13. រូបភាពប្រអប់ និងកម្រិតឱសថ

